

# Vorkurs Mathematik

## 8. Integralrechnung

Prof. Dr. Thomas Dimpfl

*Fachgebiet Wirtschaftsmathematik und Datenwissenschaften*




UNIVERSITÄT  
HOHENHEIM

## 8.1 Das bestimmte Integral

Motivation für die Integralrechnung:


- ▶ zur Berechnung der Fläche „unter einer Kurve“  
⇒ Begriff des bestimmten Integrals.

Berechnung der Fläche auf dem Intervall  $[a; b]$  unter einer konstanten Funktion mit  $f(x) = c$ :  
Der Flächeninhalt  $A$  des Rechtecks ergibt sich mittels der Formel:  
Grundlinie  $\times$  Höhe, also  $(b - a) c$ .



## 8.1 Das bestimmte Integral

Bei einer **beliebigen** auf dem Intervall  $[a; b]$  stetigen Funktion  $f(x)$  mit  $f(x) \geq 0$  steht jedoch im allgemeinen für die Berechnung der Fläche unter der Kurve keine einfache Formel zur Verfügung.



⇒ Flächenberechnung mittels eines Grenzprozesses (vgl. Ableitung).


# 8.1 Das bestimmte Integral

Beispiel mit zwei (Teil-)Intervallen:

Untersumme:

$$U = f(x_1) \cdot (x_1 - x_0) + f(x_2) \cdot (x_2 - x_1)$$


*(Unterschätzung der Fläche A)*



Obersumme:

$$O = f(x_0) \cdot (x_1 - x_0) + f(x_1) \cdot (x_2 - x_1)$$

*(Überschätzung der Fläche A)*



## 8.1 Das bestimmte Integral

Es ist offensichtlich, dass die Approximation umso genauer wird, je kleiner die Über- bzw. Unterschätzung ist. Dies wird durch schmalere Rechtecke erreicht, d.h. also durch eine Erhöhung ihrer Anzahl.

Den interessierenden Flächeninhalt erhält man über einen Grenzprozeß, wobei die Anzahl der (bspw. äquidistanten) Unterteilung  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  gegen  $n \rightarrow \infty$  strebt:

$$\text{Fläche von } A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

mit  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$  und  $x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i$ .

## 8.1 Das bestimmte Integral

Existiert der Grenzwert für die Obersumme und ebenso der Grenzwert der Untersumme und sind beide gleich, so nennt man diesen Grenzwert **bestimmtes Integral** (Riemann Integral):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

dabei ist  $x$  die **Integrationsvariable**;  $a$  und  $b$  ist die untere bzw. obere **Integrationsgrenze**.

## 8.1 Das bestimmte Integral

### ANMERKUNGEN:

- ▶ Die Definition des bestimmten Integrals ist unabhängig von der Wahl der Punkte  $\xi_i$ , d.h. sie können beliebig im Intervall  $[x_{i-1}; x_i]$  gewählt werden.
- ▶ Bedingungen für die Integrierbarkeit einer Funktion werden in zahlreichen Sätzen der Analysis aufgestellt. Das wichtigste (hinreichende) Existenzkriterium für den Grenzwert der Summe lautet: *Jede im Intervall  $[a; b]$  **stetige** Funktion  $f(x)$  ist dort auch (Riemann-)integrierbar.* Die Umkehrung dieses Satzes gilt jedoch nicht (eine integrierbare Funktion muss keineswegs stetig sein)!

## 8.1 Das bestimmte Integral

ANMERKUNGEN (Fort.):

- ▶ Das bestimmte Integral ist keine Funktion, sondern eine feste (reelle) Zahl. Dieser Wert kann auch negativ sein, da in obiger Definition nicht verlangt wird, dass der Integrand positiv ist.  
⇒ Flächenstücke oberhalb der Abszisse werden positiv gezählt, Flächenstücke unterhalb davon negativ.

## 8.1 Das bestimmte Integral

Sind  $f$  und  $g$  über dem Intervall  $[a; b]$  integrierbar, so erfüllt das bestimmte Integral folgende Rechenregeln:

$$1. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$2. \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$3. \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$4. \int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$5. \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

## 8.2 Stammfunktionen und der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

### Definition: Stammfunktion

Eine differenzierbare Funktion  $F(x)$  heißt **Stammfunktion** oder **unbestimmtes Integral** von  $f(x)$ , falls  $F'(x) = f(x)$ .

Man schreibt  $F(x) = \int f(x) dx$ .

$f(x)$  heißt **Integrand** und  $x$  heißt **Integrationsvariable**. Man bezeichnet ein unbestimmtes Integral auch mit

$$\int f(x) dx.$$

## 8.2 Stammfunktionen und der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

### Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Ist die Funktion  $f$  im Intervall  $[a; b]$  integrierbar und ist  $F$  eine Stammfunktion von  $f$  im Intervall  $[a; b]$ , so gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Schreibweise:  $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

## 8.2 Stammfunktionen und der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

---

Funktion $f$	Stammfunktion $F$
$f(x) = 0$	$F(x) = c$
$f(x) = b$	$F(x) = bx + c$
$f(x) = x^n$	$F(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c, n \in \mathbb{N}$
$f(x) = x^\alpha$	$F(x) = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + c, \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1$
$f(x) = \sin(x)$	$F(x) = -\cos(x) + c$
$f(x) = \cos(x)$	$F(x) = \sin(x) + c$
$f(x) = \sin(kx)$	$F(x) = -\frac{1}{k} \cos(kx) + c$
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x + c$
$f(x) = e^{kx}$	$F(x) = \frac{1}{k} e^{kx} + c$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln x  + c$

---